


jeudi 16 mars 2023
n°1

HERBE & FOURRAGES

COURBE DE POUSSE DE L'HERBE EN LORRAINE




UN DEMARRAGE TOUT EN DOUCEUR

LA COUVERTURE DES BESOINS PAR L'HERBE SELON LE CHARGEMENT

Pousse kg MS/j/ha	Couverture des besoins* par l'herbe selon le chargement (~15,7 kg MS/jour/UGB)				
	40 ares/UGB	50 ares/UGB	60 ares/UGB	70 ares/UGB	80 ares/UGB
7	18%	22%	27%	31%	36%
10	25%	32%	38%	45%	51%
15	38%	48%	57%	67%	76%
20	51%	64%	76%	89%	102%
30	76%	96%	115%	134%	153%

Exemple d'interprétation :

Une pousse de l'herbe de **10 Kg MS/ha/j**, permet de couvrir 32 % des besoins pour des pâtures avec chargement de 50 ares/UGB !



Parcèle suivie
* pas de mesure cette semaine

La croissance médiane des sites lorrains est de **7 Kg MS/ha/j**.

La croissance fait son démarrage avec cette semaine des variations entre 0 et 52 kg de MS/ha /jour.

CARTE DES SITES SUIVIS EN LORRAINE EN 2023

CROISSANCE MÉDIANE PAR SITE (KG DE MATIÈRE SÈCHE PAR HA ET PAR JOUR)

CONTACTS

CDA 57 - Céline Zanetti

CDA 54 - Amélie Boulanger

CDA 55 - Fanny Mesot & Tania Korner

CDA 88 - Damien Godfroy & Mélanie Biot


Arvalis - Aurélien Jomier **Agrivair** - Adrien Estevez

Source : données de l'observatoire de la pousse de l'herbe Grand Est - Chambres d'Agriculture du Grand Est, Arvalis-institut du végétal, AgriVair, Lycée agricole de Pixerecourt & le lycée agricole de Château-Salins

jeudi 16 mars 2023
n°1

#HERBE&FOURRAGES

DES REPÈRES POUR LA CONDUITE DE PRAIRIE



CÔTÉ MÉTÉO

La pluie est enfin tombée et c'est ce qui manquait pour amorcer la reprise de végétation (entre 35 et 100 mm). Les températures font le yoyo et certains secteurs plus froids sont un peu plus lents au démarrage (140 °C jours cumulés depuis le 1er février pour Gérardmer contre 230 °C jours pour Pagny sur Moselle).

COMMENTAIRES

Certains troupeaux sont déjà sortis avant les pluies. Celles-ci ont, ces derniers jours, limité la **portance** qui devrait revenir rapidement après la fin de l'épisode pluvieux qui était plus que nécessaire. Les parcelles qui présentent de l'**herbe à consommer** (soit car l'herbe a été sous valorisée en automne soit grâce à une pousse hivernale et un redémarrage précoce) pourront donc prochainement être déprimées.

Le **déprimage** permettra de créer un décalage de pousse sur les parcelles menées en pâturage tournant, de dynamiser le tallage des graminées et la croissance des légumineuses en offrant un accès permanent à la lumière et de récolter un foin de meilleure qualité en décalant les stades des espèces de plusieurs jours.

Cette technique est à réserver sur des parcelles fertilisées qui seront pâturées ou récoltées en foin.

La végétation ayant redémarré, il est désormais **trop tard pour intervenir pour du hersage** dans vos prairies !

PHOTOS DE LA SEMAINE

Prairies ennoyées en Meuse et Vosges



Fanny MESOT
CDA55
Damien GODFROY
CDA88

CONTACTS

CDA 57 - Céline Zanetti

CDA 54 - Amélie Boulanger

CDA 55 - Fanny Mesot & Tania Kornert

CDA 88 - Damien Godfroy & Mélanie Biot

Arvalis - Aurélien Jomier **Agrivair** - Adrien Estevez