


AU PROCHAIN CRENEAU FAVORABLE, LES FOINS POURRONT S'ENVISAGER

COURBE DE POUSSE DE L'HERBE EN LORRAINE

LA COUVERTURE DES BESOINS PAR L'HERBE SELON LE CHARGEMENT




Pousse kg MS/j/Ha	Couverture des besoins* par l'herbe selon le chargement			
	20 ares/UGB	30 ares/UGB	35 ares/UGB	40 ares/UGB
10	13%	19%	22%	25%
20	25%	38%	45%	51%
30	38%	57%	67%	76%
40	51%	76%	89%	102%
50	64%	96%	111%	127%
60	76%	115%	134%	153%

* Besoins à 15,7 kg de MS/jour/UGB

Exemple d'interprétation :

Avec 50 Kg MS/ha/j de pousse de l'herbe, ce sont 96 % des besoins qui sont couverts pour des pâtures avec chargement de 30 ares/UGB !



Parcèle suivie
* pas de donnée exploitable cette semaine

La croissance moyenne Lorraine de l'herbe se stabilise à 50 kg MS/Ha/jour.

CONTACTS

CDA 57 - Céline Zanetti

CDA 55 - Fanny Mesot & Tania Korner

CDA 88 - Damien Godfroy & Aurélien Jomier

CDA 54 - Amélie Boulanger & Marion Leclere

3CE - Didier Deleau

Arvalis - Célia Lefebvre

CARTE DES SITES SUIVIS EN LORRAINE EN 2024


CROISSANCE MÉDIANE PAR SITE (KG DE MATIÈRE SÈCHE PAR HA ET PAR JOUR)

Source : données de l'observatoire de la pousse de l'herbe Grand Est - Chambres d'Agriculture du Grand Est, Arvalis-institut du végétal, AgriVair, Lycée agricole de Pixerecourt & le lycée agricole de Château-Salins

CÔTÉ MÉTÉO

Les températures de saison ont fait leur retour la semaine passée permettant à la croissance de l'herbe de se maintenir. Les précipitations ont été, quant à elles limitées, permettant de retrouver un peu de portance. Le cumul de températures est de 965°C jours en moyenne sur la Lorraine. Le repère pour réaliser les foins précoces sera atteint ce weekend.

DES REPÈRES POUR LA CONDUITE DE PRAIRIE



COMMENTAIRES



Natacha KOZAK, CRAGE

Entre deux accalmies, une grosse partie des **chantiers de fauches précoces** s'est réalisée sur l'**ensemble du territoire**. Si nous sommes aujourd'hui avancés dans la saison, les valeurs alimentaires du fourrage semblent tout de même au rendez-vous et les **rendements observés** se situent aux alentours de **2,5 t de MS/ha**.

Au vu des précipitations annoncées pour les prochains jours, certaines parcelles auront probablement démarré la floraison quand la prochaine fauche pourra être engagée. A ce stade, il sera préférable de récolter ce fourrage en foin.

En vallée de Meuse et dans la Seille, les inondations ont empêché les récoltes sur certains secteurs. Le niveau d'eau est en train de redescendre laissant des parcelles où le fourrage est souillé et souvent plaqué au sol. En fonction des situations, l'impact sur la qualité du fourrage sera plus ou moins fort. Un point sera à refaire après les prochaines précipitations qui pourront avoir un effet nettoyant sur le feuillage.



Tania KORNER, CA55



CONTACTS

CDA 57 – Céline Zanetti

CDA 55 – Fanny Mesot & Tania Korner

CDA 88 – Damien Godfroy & Aurélien Jomier

CDA 54 – Amélie Boulanger & Marion Leclere

3CE – Didier Deleau **Arvalis** – Célia Lefebvre

La **reprise de végétation** après les premières coupes s'engage relativement rapidement. Dans les situations où votre disponibilité fourragère est tendue (stocks ou pâturage), un apport de 30 unités d'azote peut être envisagé.

Animation du réseau - CRAGE – Natacha KOZAK

natacha.kozak@grandest.chambagri.fr – 06 03 65 83 81